

	Yersinien-AK
Synonyme	
Probenmaterial	2 ml Serum
Abnahmehinweise	Meldepflicht siehe IfSG
Probentransport	Postversand möglich
Klinische Indikationen	Yersinia enterocolitica, (Serotypen 03; 09), Yersinia pseudotuberculosis; Yersinien sind gramnegative Stäbchenbakterien, die meist durch kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel übertragen werden. Diarrhoe häufig mit starken Bauchschmerzen. Inkubationszeit 5-7 Tage. Saisonale Häufung im Winter. Die Ausscheidung der Yersinien mit dem Stuhl kann mehrere Wochen nach Ende der Diarrhoe fortbestehen. Komplikationen post infectionem insbesondere bei HLA B 27 positiven Patienten, reaktive Arthritis, Erythema nodosum, Uveitis, akute Glomerulonephritis und Myokarditis.
Methode	EIA
Referenzbereich	< 25 U/ml

Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Genauere Daten zu Referenzbereichen entnehmen Sie bitte unseren Befundschreiben. Alle Angaben z.B. zu klinischen Indikationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr. Weitere Fragen nehmen wir gerne über unser Kontaktformular entgegen.